

SyrSpend® SF

Πίνακας συμβατότητας

Λεζάντα

- Συμβατός συνδυασμός για 30 ημέρες
- Συμβατός συνδυασμός για 60 ημέρες
- Συμβατός συνδυασμός για 90 ημέρες
- ⊗ Συνδυασμός που δε συνιστάται

Για SyrSpend® SF PH4 (Εναιώρημα)*

Συνθήκες αποθήκευσης

- 🏠 15-25°C
- ❄️ 2-8°C

Απευθείας αναμειξίμο**

- ✔️ Η διαβροχή δεν είναι απαραίτητη
- ❌ Η διαβροχή πριν από την παρασκευή εναιωρήματος συνιστάται

API

API	Concentration	SyrSpend® SF PH4 (ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ)	SyrSpend® SF PH4 (ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ)*	SyrSpend® SF ALKA (ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ)*
Midazolam HCl	1 mg/ml	●	🏠	✔️
Nifedipine	4 mg/ml	●	🏠	❌
Nitrofurantoin	10 mg/ml	●	🏠	❌
Omeprazole	2 mg/ml	⊗	⊗	⊗
Ondansetron HCl	0.8 mg/ml	●	🏠	✔️
Oseltamivir phosphate	15 mg/ml	●	❄️	✔️
Phenobarbital	9 mg/ml	●	🏠	❌
Prednisolone sodium phosphate	1 mg/ml	●	🏠	✔️
Propranolol HCl	1 mg/ml	●	🏠	✔️
Propylthiouracil	5 mg/ml	●	🏠	❌
Quinidine sulfate	10 mg/ml	●	🏠	❌
Ranitidine HCl	14 mg/ml	●	❄️	❌
Rifampicin	25 mg/ml	●	🏠	❌
Sildenafil citrate	2.5 mg/ml	●	🏠	❌
Simvastatin	1 mg/ml	●	❄️	❌
Sotalol HCl	5 mg/ml	●	🏠	✔️
Spirolactone	25 mg/ml	●	🏠	❌
Spirolactone/hydrochlorothiazide	5/5 mg/ml	●	🏠	❌
Sulfadiazine	100 mg/ml	●	🏠	❌
Sulfasalazine	100 mg/ml	●	🏠	❌
Sumatriptan succinate	5 mg/ml	14 ημ.	❄️	✔️
Terbinafine HCl	25 mg/ml	●	🏠	❌
Tetracycline HCl	25 mg/ml	7 ημ.	❄️	✔️
Theophylline	5 mg/ml	●	🏠	❌
Thiamine HCl	100 mg/ml	●	🏠	❌
Tiagabine HCl	1 mg/ml	●	❄️	✔️
Tramadol HCl	5 mg/ml	●	🏠	✔️
Ursodeoxycholic acid (ursodiol)	30 mg/ml	●	❄️	❌
Valaciclovir HCl	50 mg/ml	14 ημ.	❄️	✔️
Valsartan	4 mg/ml	●	❄️	❌
Vancomycin HCl	50 mg/ml	●	❄️	❌
Verapamil HCl	50 mg/ml	●	❄️	❌
Zonisamide	10 mg/ml	14 ημ.	❄️	❌

* Τα εναιωρήματα με τη χρήση των SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη) και SyrSpend® SF Alka (ξηρή σκόνη) δεν περιέχουν συντηρητικά και πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2-8°C.

** Διαδικασία διαβροχής: προσθέστε κατάλληλη ποσότητα SyrSpend® SF PH4 (εναιώρημα).

Τα μέσα εναιωρήματος SyrSpend® SF επιτρέπουν την παρασκευή σταθερών εναιωρημάτων για ένα ευρύ φάσμα δραστικών ουσιών (APIs). Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει μερικούς συμβατούς συνδυασμούς για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σταθερότητας αποδεικνύοντας την ευρεία εφαρμογή τους για παρασκευή γαληνικών φαρμάκων. Η απουσία ενός δραστικού συστατικού από τον πίνακα συμβατότητας δε συνιστά παραδοχή ότι δε μπορεί να αναμειχθεί με το μέσο εναιωρησης SyrSpend® SF. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται στον παρασκευαστή φαρμακοποιό να σημάνει μία σύντομη ημερομηνία λήξης βασισμένη σε εσωτερικά πρωτόκολλα ασφαλείας, ανάλυση ρίσκου ή κατευθυντήριες αναφορές από επικαιροποιημένες φαρμακοποιίες.

