



**Διαπερατότητα των
δραστικών ουσιών σε
γαλινικά σκευάσματα
τοπικής αναισθησίας
με τη βάση κρέμας
Versatile™**



Το τμήμα Φαρμακευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε μια in vitro μελέτη διαπερατότητας των δραστικών ουσιών Βενζοκαΐνη / Λιδοκαΐνη / Τετρακαΐνη σε γαλινικά σκευάσματα τοπικής αναισθησίας με τη χρήση πειραματικού σχεδιασμού. Μετά τη διεξαγωγή συνδυαστικού πειραματικού σχεδιασμού για την εύρεση των βέλτιστων


σκευασμάτων (διαφορετικές συγκεντρώσεις δραστικών ουσιών / βάσης) ο φαρμακοτεχνικά σταθερός συνδυασμός με την ασφαλέστερη και καλύτερη διαπερατότητα κατά την χορήγηση φάνηκε να είναι ο 20-6-4 (BLT). Ως βάση για τον συνδυασμό του BLT προτείνεται η Versatile™ έναντι της PLO με καλύτερη διαπερατότητα και στη τεχνητή μεμβράνη Strat-M και στο δέρμα.

Σύγκριση αποτελεσμάτων της 20-6-4 σε Versatile™ έναντι της 20-6-4 σε PLO χρησιμοποιώντας Strat-M®




Σύγκριση διαπερατότητας της Βενζοκαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας Strat-M®.

Σύγκριση διαπερατότητας της Λιδοκαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας Strat-M®



Σύγκριση διαπερατότητας της Τετρακαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας Strat-M®



Σύγκριση διαπερατότητας της Τετρακαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας Strat-M®.


✓ Αποτέλεσμα
Υψηλότερη διαπερατότητα εμφανίζει η Versatile™ χρησιμοποιώντας Strat-M®.

Σύγκριση αποτελεσμάτων της 20-6-4 σε Versatile™ έναντι της 20-6-4 σε PLO χρησιμοποιώντας δέρμα




Σύγκριση διαπερατότητας της Βενζοκαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας δέρμα.

Σύγκριση διαπερατότητας της Λιδοκαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας δέρμα



Σύγκριση διαπερατότητας της Τετρακαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας δέρμα



Σύγκριση διαπερατότητας της Τετρακαΐνης σε 20-6-4 Versatile™ & 20-6-4 PLO χρησιμοποιώντας δέρμα.

✓ Αποτέλεσμα
Υψηλότερη διαπερατότητα εμφανίζει η Versatile™ χρησιμοποιώντας δέρμα.



Fagron Derma Pack BLTV

Το Fagron Advanced Derma Convenience Pack BLTV περιλαμβάνει Benzocaine micronized 20%, Lidocaine 6%, Tetracaine 4%, βάση γαλινικής παρασκευής Versatile™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.

Αποκτήστε το