

# Fagron Advanced Derma

Πίνακας συμβατότητας

## Λεζάντα

Συμβατός συνδυασμός για

- 14/15 ημέρες
- 30 ημέρες
- 60 ημέρες
- 90 ημέρες

★ Συνιστώμενος συνδυασμός

% Μέγιστη συμβατότητα

⊗ Συνδυασμός που δε συνίσταται

○ Συνδυασμός χωρίς μελέτη συμβατότητας

## API/DCI

| API/DCI                            | Δοσολογία       | Τύποι δέρματος |                |            |                 |              |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                 | Λιπαρό δέρμα   | Κανονικό δέρμα | Ξηρό δέρμα | Πολύ ξηρό δέρμα | Προσβ. δέρμα | Ευαίσθητο δέρμα | Ευαίσθητο δέρμα | Ευαίσθητο δέρμα | Ευαίσθητο δέρμα |
| Alfatradiol (17α-estradiol)        | 0.025 έως 0.05% | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ●               | ○               | ○               | ●               |
| Aloe vera extract                  | 0.5 έως 10%     | ○              | ●              | ●          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ●               | ⊗               | ○               |
| Alpha bisabolol                    | 0.5 έως 5%      | ○              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | 1% ●            | ○               | ○               |
| Ammonium lactate                   | 1 έως 12%       | ○              | ●              | 10% ●      | 10% ●           | 8% ●         | ⊗               | ○               | ○               | ○               |
| Anthralkine/dithranol              | 0.05 έως 3%     | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Arginine HCl                       | 2.5%            | ○              | ●              | ●          | ●               | ●            | ⊗               | ⊗               | ○               | ○               |
| Ascorbic acid (vit. C)             | 5 έως 15%       | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ⊗               | 10% ●           | ○               | ○               |
| Azelaic acid                       | 10 έως 20%      | ○              | ⊗              | ●          | ●               | ○            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Benzoyl peroxide                   | 2.5 έως 10%     | ○              | ○              | ●          | ●               | ⊗            | 5% ●            | ○               | ○               | ○               |
| Benzyl benzoate                    | 25%             | ○              | ●              | ⊗          | ●               | ○            | ⊗               | ○               | ○               | ○               |
| Betamethasone dipropionate         | 0.05%           | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Betamethasone valerate             | 0.025 έως 0.1%  | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Caffeine                           | 1 έως 2%        | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ○               | ●               |
| Chamomile extract                  | 0.5 έως 5%      | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ⊗               | ○               |
| Ciclopirox olamine                 | 1%              | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Clindamycin HCl                    | 1 έως 3%        | ○              | ○              | ●          | ●               | ○            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Clobetasol propionate              | 0.05%           | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ○               | ●               |
| Clotrimazole                       | 1 έως 2%        | ○              | ●              | ●          | ●               | ○            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Coal tar crude (pix lithanthracis) | 1 έως 10%       | ●              | ●              | ●          | ●               | ○            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Coal tar solution (LCD)            | 5 έως 20%       | 10% ●          | ●              | 10% ●      | 10% ●           | ○            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Cyanocobalamin (vit. B12)          | 0.07%           | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Desonide                           | 0.05 έως 0.1%   | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Desoximetasone                     | 0.25%           | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Dexpanthenol                       | 0.5 έως 5%      | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ⊗               | ○               |
| Diclofenac sodium                  | 3%              | ○              | ●              | ●          | ●               | ○            | ⊗               | ●               | ○               | ○               |
| Difflocortolone valerate           | 0.1 έως 0.3%    | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Erythromycin                       | 0.5 έως 4%      | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Finasteride                        | 0.1%            | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ○               | ●               | ○               | ●               |
| Fluocinolone acetonide             | 0.01 έως 0.1%   | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Glycerol                           | 0.5 έως 20%     | ●              | ●              | ●          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ●               | ○               | ○               |
| Glycolic acid                      | 5 έως 15%       | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ○               | ○               |
| Hyaluronic acid                    | 0.2 έως 2.5%    | ●              | ⊗              | ⊗          | ⊗               | ○            | ⊗               | ⊗               | ○               | ○               |
| Hydrocortisone                     | 0.25 έως 2.5%   | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Hydrocortisone acetate             | 0.25 έως 2.5%   | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Hydroquinone                       | 2 έως 10%       | ○              | ○              | ⊗          | ⊗               | ★            | ⊗               | ⊗               | ○               | ○               |
| Ketoconazole                       | 2%              | ○              | ●              | ●          | ●               | ○            | ●               | ●               | ○               | ●               |
| Kojic acid                         | 1 έως 4%        | ○              | ○              | ○          | ○               | ●            | ●               | ●               | ○               | ○               |
| Lactic acid                        | 1 έως 20%       | ○              | 10% ●          | ●          | ●               | ○            | ●               | ●               | ○               | ○               |
| Latanoprost                        | 0.005%          | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ●               | 120 ημ.         | ○               | ●               |
| Lidocaine                          | 0.5 έως 10%     | 5% ●           | ○              | ○          | ○               | ○            | ○               | ○               | ○               | ○               |
| Lidocaine HCl                      | 0.5 έως 5%      | ⊗              | 5% ●           | ●          | ●               | ●            | ⊗               | ●               | ○               | ○               |
| Melatonin                          | 0.0033 έως 0.1% | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ●               | ●               | ○               | ●               |
| Menthol                            | 1 έως 3%        | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | 0.33% ●         | ●               |
| Metronidazole                      | 0.5 έως 3%      | ○              | ○              | ●          | ●               | ⊗            | ●               | ●               | ○               | ○               |
| Minoxidil                          | 2 έως 5%        | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ●               | ●               | ○               | 180 ημ.         |
| Mometasone furoate                 | 0.1%            | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Nicotinamide (vit. B3)             | 2 έως 5%        | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ⊗               | ○               |
| Permethrin                         | 5 έως 15%       | ○              | ●              | ●          | ○               | ○            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Prostaquinon™                      | 3%              | ○              | ○              | ○          | ○               | ○            | ○               | ○               | ○               | 3% ●            |
| Resorcinol                         | 15%             | ○              | ○              | ⊗          | ⊗               | ★            | ⊗               | ○               | ○               | ○               |
| Retinol (vit. A)                   | 0.4%            | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ○               | ○               |
| Salicylic acid                     | 0.5 έως 20%     | ●              | ●              | 10% ●      | 10% ●           | ○            | 5% ●            | ○               | ○               | ○               |
| Shea butter                        | 1 έως 20%       | ●              | ●              | ⊗          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ⊗               | ⊗               | ○               |
| Sodium hyaluronate                 | 1%              | ○              | ○              | ○          | ○               | ●            | ○               | ●               | ○               | ○               |
| Sulfur                             | 5 έως 10%       | ●              | ●              | ●          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ○               | ○               | ○               |
| Tacrolimus                         | 0.03 έως 0.5%   | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Tetracycline HCl                   | 2 έως 3%        | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ⊗               | ○               | ○               | ○               |
| Tocopherol (vit. E)                | 0.5 έως 20%     | ●              | ●              | ●          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ●               | ○               | ○               |
| Tretinoin (vit. A acid)            | 0.01 έως 0.1%   | ○              | ○              | ●          | ●               | ●            | ●               | ●               | ○               | ●               |
| Triamcinolone acetonide            | 0.025 έως 0.1%  | ●              | ●              | ●          | ●               | ●            | ●               | ○               | ○               | ○               |
| Urea                               | 5 έως 40%       | ⊗              | 10% ●          | ●          | ●               | ○            | ●               | ○               | ⊗               | ○               |
| Zinc oxide                         | 1 έως 40%       | ●              | ●              | 25% ●      | 10% ●           | 8% ●         | 5% ●            | ○               | ○               | ○               |
| Zinc sulfate                       | 1 έως 10%       | ●              | ●              | ●          | ●               | 8% ●         | 5% ●            | ⊗               | ○               | ○               |

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων Compounding Matters στο [fagron.gr](http://fagron.gr) για να έχετε πρόσβαση σε βάση δεδομένων συνταγών και επιπλέον πληροφορίες για οδηγίες παρασκευής και συνθήκες αποθήκευσης.

Ο πίνακας συμβατότητας είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε από ιατρούς και φαρμακοποιούς για να σας διευκολύνει να αναζητήσετε τους βέλτιστους συνδυασμούς μεταξύ των γαλιγκών βάσεων Fagron Advanced Derma και των διάφορων φαρμακευτικών ουσιών, όπως είναι οι δραστικές ουσίες (APIs) και τα δερματολογικά συστατικά που βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος (DCIs). Ο πίνακας περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό των κύριων APIs και DCIs που χρησιμοποιούνται στην δερματολογία. Ο πίνακας συμβατότητας άλλα και η δωρεάν βάση δεδομένων συνταγών Compounding Matters υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας να ανακαλύψουν θεραπευτικές επιλογές. APIs και DCIs που δεν συμπεριλαμβάνονται και στις δύο πηγές πληροφορίας μπορούν επίσης να σχηματίσουν ένα σταθερό γαλιγκό παρασκεύασμα ώστε να βελτιώσει την άνεση και συμβατότητα του ασθενή με τη φαρμακοθεραπεία. Περαιτέρω συνδυασμός δραστικών σε μια βάση είναι εφικτή με σκοπό την εξειδίκευση της φαρμακοθεραπείας, ενώ η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τους επιθυμητούς συνδυασμούς από τους επιστήμονες υγείας με σκοπό τη σταθερότητα του τελικού σκευάσματος. Όταν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία μελέτης συμβατότητας για ένα συγκεκριμένο API/DCI, προτείνεται ο φαρμακοποιός να υπολογίσει την ημερομηνία λήξης του γαλιγκού παρασκευάσματος με βάση εσωτερικά πρωτόκολλα, την ανάλυση ρίσκου ή τις οδηγίες όπως επιτάσσει οποιαδήποτε αναγνωρισμένη φαρμακοποία.

**Fagron Hellas**  
 12 Χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισα  
 Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32  
 Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5  
 F +30 24310 83615  
[www.fagron.gr](http://www.fagron.gr)



FADct08 / 20190227

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται ανασφορές σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς και δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Τα περιεχόμενα του παρόντος φυλλαδίου δε μπορεί να ερμηνευθεί ως κατακή συμβολή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας - ιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να πράξουν μόνο αφού κριθείται σκόπιμα και σύμφωνα με την δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η αποτελεσματικότητα κάθε συνταγής είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο παρασκευής του κατάλληλου φαρμάκου, την επίλογό του κατάλληλου εργαστηρίου παρασκευής ενώ το παρόν είναι ένα απλό προϊόν που δε δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες στις σχέσεις των ανωνυμικών. Για τους ανωνυμικούς παρασκευαστές, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και για οποιαδήποτε παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως προς το τελικό γαλιανικό παρασκεύασμα.

